



会发生以下不良事件

：

痛。

性水肿

光

，白内障，青光眼等，以及更罕见的一

如有严重或频繁地流鼻血，近期鼻溃疡，鼻部手术或有未愈合的鼻损伤，请咨询医生。
如症状持续或恶化，或出现新症状，请停止使用并咨询医生。

【药物相互作用】

应避免与酮康唑合用。

如与其他药
盒

； 支 盒

内包装容器为棕色玻璃瓶，配有鼻适配器；

【有效期】

24 个月。

【执行标准】



邮政编码：200245

电话号码：800-820-1188 400-888-3060

如有问题可与生产企业联系

如何使用布地奈德鼻喷雾剂

使用布地奈德鼻喷雾剂前请阅读说明书，小心

次只需对空气喷压一次即

可。

1. 擤鼻，振摇药瓶，打开棕色的保护盖。
2. 照图示姿势握住药瓶。（图 1）
3. 将喷头插入鼻孔，喷压处方规定的剂量。同法在另一鼻孔喷药。（图 2）
4. 盖上瓶盖，喷药次数不要超过医生处方量。




图 1



图 2

儿童

儿童必须在成人的监督下使用本药，以确保其依处方量正确给药。

清洁

定期清洁药瓶上部的塑料部分，打开瓶盖，拧开白色喷头，在温水中清洗塑料部分，在空气中晾干然后重新装上药瓶。

雷诺考特®