

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

# 息斯敏®

OTC

### 【注意事项】

- 1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下使用。
- 2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。


息斯敏



适应症：用于治疗季节性过敏性鼻炎（鼻部或眼部症状）及特发性荨麻疹。

息斯敏

10mg x 10片装



10mg x 10片装

适应症：用于治疗季节性过敏性鼻炎（鼻部或眼部症状）及特发性荨麻疹。



先服10片  
入口即缓解



OTC  
甲类

氯雷他定口腔崩解片说明书

息斯敏®

【用法用量】  
口服。成人每次10毫克，每日2次。  
儿童每次5毫克，每日2次。  
本品为片剂，可整片吞服，也可将片剂置于口中，随唾液迅速溶解。



【用法用量】

将氯雷他定口腔崩解片取出，置于口中，药片随唾液迅速溶解。



无需用水  
入口即溶

【不良反应】

在每天10毫克的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃痛以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

【禁忌】

禁用于对本品及其所含成份过敏者。